

AUTORISATION PARENTALE

Par la présente le(a) soussigné(e) autorise l'enfant mineur

_____ (nom / prénom de l'enfant)

à apprendre et à pratiquer la plongée subaquatique ainsi qu'à passer les tests des différents brevets (notamment un baptême de plongée).

Il/elle reconnaît formellement avoir pris connaissance des statuts et règlements en vigueur de l'a.s.b.l. PLONGEURS DIFFERDANGE, du fait que l'enfant pratique la plongée subaquatique à ses propres risques et périls, et confirme avoir été informé des risques encourus et décharge l'a.s.b.l. Plongeurs Differdange et les personnes concernés (moniteurs, chefs palanquées et autres responsables) de toutes responsabilités.

L'a.s.b.l. Plongeurs Differdange décline toute responsabilité en dehors des lieux et horaires d'entraînements (y compris pour tout ce qui a trait aux déplacements vers le lieu d'entraînement, respectivement le retour à domicile).

Nom et prénom _____

Qualité (mère, père ou tuteur) _____

Tél. Privé _____ GSM _____ Bureau _____

Adresse E-mail _____

(adresse à laquelle seront également envoyés les courrier du PLD)

_____, le _____

Signature (mère, père, ou tuteur)

Conditions d'admission pour mineurs

- être âgé d'au moins 12 ans ;
- les mineurs sont tenus de respecter les consignes et instructions des responsables ;
- la présence d'un représentant légal pourra être requise sur les lieux des entraînements ;
- toute décision de refus d'admission définitive sera prise et prononcée par le Conseil d'Administration sur avis du Comité Technique.

Contre-Indications à la plongée

- pathologie cardiaque (toute affection cardiaque sous traitement)
- pathologie « O.R.L. » (infection quelconque, rhume, perforation tympanique)
- pathologie pneumologique (asthme, insuffisance respiratoire, pneumothorax)
- pathologie neurologique (épilepsie)
- autres pathologies graves (diabète, etc.)

Pour plus de détails, une liste complète de contre – indications (définitives et temporaires) à la plongée en scaphandre peut être trouvée soit sur le dos du certificat médical de la F.L.A.S.S.A., soit sur notre site internet (www.pld.lu), soit sur le site internet de la fédération F.L.A.S.S.A. (www.flassa.lu) → voir page 2



Fédération Luxembourgeoise des Activités et Sports Sub-Aquatiques

F.L.A.S.S.A.

Membre du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.)
Affiliée à la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques C.M.A.S.

CONTRE - INDICATIONS A LA PLONGEE EN SCAPHANDRE

La liste des contre-indications ci-après est indicative. En cas de doute, un second avis est conseillé.

	CONTRE - INDICATIONS DEFINITIVES CLINIQUEMENT DECELABLES	CONTRE - INDICATIONS TEMPORAIRES SOUMISES A L'APPRECIATION DU MEDECIN
CARDIOLOGIE	<ul style="list-style-type: none"> Toute affection cardiaque évolutive ou chronique séquellaire sous traitement Cardiomyopathie ischémique grave Hypertension artérielle sévère Infarctus Artérite stade III - IV Angine de poitrine Tachycardie paroxystique : Bouveret Traitement par : Anticoagulant - Bêtabloquant - Antiarythmique 	<ul style="list-style-type: none"> Affection cardio-vasculaire à évaluer
O.R.L.	<ul style="list-style-type: none"> Surdité unilatérale : cophose Déficit audiométrique bilatéral > 40 db Otospongiose opérée 	<ul style="list-style-type: none"> Episode infectieux Syndrome vertigineux à évaluer Problème tubaire itératif Perforation tympanique Tympanoplastie à évaluer après impédancemétrie Ostéomes majeurs du conduit non opéré
PNEUMOLOGIE	<ul style="list-style-type: none"> Asthme Insuffisance respiratoire chronique Pneumothorax spontané Syndrome interstitiel évolutif : Fibrose pulmonaire Sarcoïdose stade II - III Pleurésie ou implant creux 	<ul style="list-style-type: none"> Pathologie infectieuse Pleurésie après évaluation par E.F.R. Sarcoïdose : stade I à évaluer après E.F.R.
OPHTALMOLOGIE	<ul style="list-style-type: none"> Kératotomie radiaire Kératocône Pathologie de la rétine à évaluer Prothèse ou implant creux 	<ul style="list-style-type: none"> Chirurgie oculaire à évaluer après 1 an Traitement pour décollement rétinien à évaluer Glaucome à évaluer Altération du champ visuel à évaluer
NEUROLOGIE	<ul style="list-style-type: none"> Epilepsie Traumatisme crânien avec séquelles Perte de connaissance répétitive d'étiologie indéterminée Chirurgie endocrânienne pour affection évolutive 	
PSYCHIATRIE	<ul style="list-style-type: none"> Affection psychiatrique sévère 	Traitement majeur par antidépresseur, Anxiolytique, Neuroleptique
ENDOCRINOLOGIE - METABOLISME	<ul style="list-style-type: none"> Diabète insulino-dépendant 	<ul style="list-style-type: none"> Troubles endocriniens à évaluer État spasmodique à évaluer
GYNECOLOGIE		<ul style="list-style-type: none"> Grossesse
DENTAIRE		<ul style="list-style-type: none"> Prothèse amovible : nécessité de l'enlever Caries
GASTROLOGIE		<ul style="list-style-type: none"> Hernie hiatale ou reflux gastro-oesophagien Ulcère digestif

TOUTE PRISE MEDICAMENTEUSE DOIT ETRE APPRECIEE.

LA REPRISE DE LA PLONGEE APRES UN ACCIDENT DE DECOMPRESSION, UNE SURPRESSION PULMONAIRE, UN PASSAGE EN CAISSON HYPERBARE OU TOUT AUTRE ACCIDENT SEVERE NECESSITERA L'AVIS D'UN MEDECIN FEDERAL !!!